

### **3° Premio**

Trabajo libre **VARIANTE PARTICULAR DE TOXICODERMIA: ERITEMA FIJO**

#### **MEDICAMENTOSO**

*Dres. Juana Lo Presti, Marcela Marrero, María Madrid Rivero, María Ferrando, Karina Brutti, Marta La Forgia*

Hospital G.A. "José María Penna"

#### **VARIANTE PARTICULAR DE TOXICODERMIA: ERITEMA FIJO MEDICAMENTOSO**

##### Introducción:

El Eritema Fijo Medicamentoso es una toxicodermia caracterizada por la aparición de máculas cutáneas y/o en mucosas que recurren en la misma localización luego de la administración del agente causal (fármacos en un 85% de los casos)

##### Caso clínico:

Paciente femenina de 28 años, oriunda de la Pcia de Bs. As., mucama en guardia hospitalaria, que consulta por máculas pruriginosas, eritematovioláceas en abdomen, brazo y pierna izq., de 48 [hs.de](#) evolución. En tratamiento por acné inflamatorio facial en el consultorio de Acné con escasa adherencia a las indicaciones médicas.

##### Antecedente de enfermedad actual:

Se le indica tratamiento con minociclina 100 mg/día y eritromicina loción. La paciente se automedica con muestras médicas de doxiciclina 100 mg. Y además toma alprazolam y diclofenac por su cuenta.

##### Exámen físico:

Presenta 3 máculas ovaladas, en el centro eritematovioláceas y con halo periférico más claro. Una en abdomen, en región paraumbilical derecha, de 7 cm. Las otras de menor tamaño en antebrazo y pierna izquierda.

Laboratorio de rutina: Sin particularidades

##### Estudio histopatológico:

Espongiosis en epidermis e infiltrado mononuclear perivascular e intersticial, compatible con Eritema fijo por Drogas.

##### Conducta:

Suspender todo fármaco. Se indican antihistamínicos. Las lesiones muestran resolución e hiperpigmentación residual.

##### Interés del caso:

En la erupción fija por drogas el diagnóstico es fundamentalmente clínico basado en una anamnesis farmacológica exhaustiva.

La polimedicación propia de pacientes añosos o como en este caso la accesibilidad a los medicamentos del personal de la salud pueden estar implicadas en su aparición.

Bibliografía:

1-Eritema fijo medicamentoso: claves diagnósticas. Agusti Mejias A y col. Semergen 2011; 37num 04 , p 215-8

2-The usefulness of skin tests to prove drug hypersensitivity  
K. Lammintausta y col. Contact Dermatitis and Allergy 2005;152, p 968–974

3-Patch-tests medicamenteux dans l’exploration  
des taxidermies Drug patch tests in the investigation of cutaneous adverse drug reactions  
Barbaud A y col. Annales de dermatologie et de vénéréologie (2009) 136, 635—644

---